

# BRONQUIOLITIS

## INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES

### ¿QUÉ ES?:

- Es una infección vírica que afecta a menores de 2 años (predominantemente en el invierno) y que puede causar dificultad respiratoria
- Generalmente, se inicia con tos y mucosidad nasal
- Otros síntomas pueden ser fiebre, disminución de la ingesta o irritabilidad
- Los síntomas pueden persistir durante 2-4 semanas

### ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?:

- El diagnóstico es clínico (historia clínica y exploración física)
- Las radiografías de tórax y las analíticas sanguíneas no deben usarse para el diagnóstico

### ¿CÓMO SE TRATA?:

- El tratamiento de soporte es el pilar fundamental
- Los principales objetivos en el tratamiento son mantener un adecuado estado respiratorio y de hidratación
- No se recomienda el uso de broncodilatadores, ni corticoides, ni antibióticos ni antitusígenos para el tratamiento de la bronquiolitis

### CRITERIOS DE INGRESO U OBSERVACIÓN ESTRECHA:

- Pacientes que requieren hidratación intravenosa
- Pacientes que requieren oxigenoterapia
- Menores de 6-8 semanas o con factores de riesgo: prematuridad, inmunodeficiencia, enfermedad cardiorrespiratoria de base...
- Pacientes con dificultad respiratoria persistente, o que presenten frecuencias cardíacas o respiratorias elevadas de forma persistente (FC>160-170 lpm, FR>60-70 rpm)